

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU NORD-OUEST (Tél. Arras 23-14)

(SEINE-MARITIME, SOMME, PAS-DE-CALAIS, NORD)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux.

C. C. P. : LILLE 57-01-67

ABONNEMENT ANNUEL

~~XXXXXXX~~  
12 NF

15,00F

N° XXXVI - Septembre 63

## INFORMATIONS

## MILDIOU SUR TUBERCULES

## POMMES DE TERRE

Les dégâts sur tubercules sont variables en fonction de chaque culture. Cependant, ils sont fréquents cette année surtout dans les champs mal protégés en début de saison ou défanés trop tard.

Il y a donc lieu d'observer le maximum de précautions au moment de la récolte (en opérant par temps sec, en faisant ressuyer les tubercules avant le ramassage et éventuellement en éliminant rigoureusement tout reste de feuillage avant l'arrachage.

De plus, en cours de conservation, le Mildiou ne s'étend pratiquement pas mais les tubercules mildioués ou blessés peuvent être le siège de pourritures humides qui, elles, peuvent gagner les tubercules voisins. Ainsi, un petit nombre de tubercules malades peut créer un risque pour l'ensemble du lot. Il est donc prudent d'opérer un triage soigneux, une quinzaine de jours après l'arrachage et avant le stockage définitif, en particulier en cas de conservation en silos.

## DESINFECTION DES SEMENCES

## C O L Z A

Pour lutter contre les fontes de semis, les graines doivent être enrobées à l'aide d'un produit fongicide (ex : T M T D, Oxyquinoléate de cuivre, organomercuriques). Cette opération est souvent effectuée par l'organisme commercialisant les graines (le vérifier sur l'étiquette d'origine).

De plus, en particulier pour les semis précoces, il y a grand intérêt à opérer une protection contre les Altises par l'adjonction d'un insecticide. Le produit le plus employé est le Lindane à raison de 30-40 Grs de matière active par kilog. de semences (l'adhérence est facilitée par l'adjonction d'un peu d'huile de table).

## T A V E L U R E S

## CULTURES FRUITIERES

La forte pluviosité de l'été favorise le développement tardif des tavelures. Il est prudent donc d'effectuer une ou deux pulvérisations fongicides avant la récolte, ce qui peut limiter en outre l'extension de certaines maladies de conservation.

Le Contrôleur chargé des  
Avertissements Agricoles,

R. DIVOUX

L'Inspecteur de la  
Protection des végétaux,

P. COUTURIER